

PROTOCOLO "BORREGOS"

Parte 1: Línea central (columna vertebral)

- Ubicación: Línea media de la espalda, directamente sobre la columna vertebral.
- Procedimiento:
 - Coloca el electrodo en la línea del nacimiento del cabello (parte superior de la nuca).
 - Desliza el SCENAR verticalmente hacia abajo, siguiendo la columna, hasta alcanzar la altura aproximada de la 12ª costilla.
 - Desliza el SCENAR manteniendo un ritmo uniforme, hasta observar una asimetría de hiperemia (enrojecimiento desigual de la piel).

Parte 2: Línea paravertebral izquierda

- Ubicación: A la izquierda de la columna, siguiendo la línea paravertebral (aproximadamente a 1-2 cm del borde de la columna o el espacio de 1 electrodo del SCENAR).
- Procedimiento:
 - Inicia nuevamente desde la línea del nacimiento del cabello.
 - Desliza el electrodo de forma vertical hacia abajo, siguiendo la línea paravertebral izquierda hasta la 12ª costilla.
 - Repite el movimiento hasta obtener una respuesta de hiperemia visible.

Parte 3: Línea paravertebral derecha

- Ubicación: A la derecha de la columna, en la línea paravertebral correspondiente.
- Procedimiento:
 - Repite exactamente el mismo proceso que en la parte anterior, pero ahora en el lado derecho de la espalda.
 - Desliza el electrodo desde la línea del nacimiento del cabello hasta la 12ª costilla, buscando nuevamente la respuesta de hiperemia.

Indicaciones

Problemas respiratorios (pulmones, bronquios, nariz,) y como recíproco de problemas en aparato digestivo .

Parámetros

Diagnóstico: D0
Frecuencia : 350 Hz
FM: SW1 , On

Duración

Aproximadamente de 15 min

Límites anatómicos

Línea del nacimiento del cabello, Línea central columna (hasta zona dorsal), Línea paravertebral desde cervicales a dorsales.



TIP:

- La aparición de hiperemia (enrojecimiento) en cada línea es el indicador de una estimulación suficiente.
- Si no aparece, es recomendable repetir los pases hasta lograrla.

PROTOCOLO "BORREGOS"

Parte 4: Espirales en zona torácica izquierda (Zona lateral del tórax)

- Ubicación inicial: Coloca el electrodo en la unión entre la línea medio-axilar y el 11.º espacio intercostal, en el lado izquierdo del tórax.
- Procedimiento:
 - Primer recorrido:
 - Desliza el electrodo desde la línea medio-axilar hacia la línea paravertebral izquierda, haciendo movimientos en espiral de pequeña amplitud a favor de las manecillas del reloj (como un pequeño remolino).
 - Segundo recorrido (superior):
 - Sin despegar el electrodo de la piel, sube un nivel, superponiendo ligeramente las espirales anteriores.
 - Mueve el electrodo desde la línea paravertebral hacia la línea medio-axilar en dirección contraria a las manecillas del reloj.
 - Repetir el patrón:
 - Continúa alternando la dirección del movimiento y del giro del electrodo, subiendo progresivamente en capas hasta alcanzar la parte superior del cuello.

Parte 5: Espirales en zona torácica derecha (Zona lateral del tórax)

- Repite el mismo procedimiento en el lado derecho del tórax.

NOTA: Repite Parte 4 y 5 un total de 3 veces.


No realices un tratamiento adicional sobre las asimetrías.



TIP:

En caso de que se perciba fuerte adherencia al mover el electrodo, se recomienda sujetar ligeramente la piel para facilitar un deslizamiento suave y continuo.

PROTOCOLO "BORREGOS"



TIP:

Un recíproco de la zona pulmonar son los intestinos (detox abdomen).